

dine longior, anticeem versus angustatus, pronoto transverso quam mesonotum aequelongo, mesonoto in ♀ lineis parapsidalibus completis, in ♂ haud distinctis, scutello transverso in ♂ integro, in ♀ per lineas 2 longitudinales 3-partito, postscutello transverso, segmento mediario stigmatis rotundatis, pleuris sat brevibus. Abdomen sessile (♀) vel petiolatum (♂), segmentis indistincte separatis, aculeo a dimidio ventrali orto, alis (♀) bene evolutis, (♂) dimidium abdominis haud attingentibus, venis subcostali, marginali et stigmati evolutis, postmarginali vix nulla. Pedes normales, mitrochanterati, unicalcarati, tarsis 4-articulatis, unguibus simpleibus.

Typus: *Sphecoptagus sceliphronidis*, n. sp.

### **Sphecoptagus sceliphronidis** Bréthes, n. sp.

♀ *Niger, antennis (funiculo paulum obscurius) pedibusque ferrugineo-testaceis; clypeo, fronte in medio longitrorsum, marginibus oculorum, regionis ocellorum marginibus cum margine oculorum per lineam transversam conjunctis, mesonoto lineis parapsidalibus, scutello antice et lineis 2 longitudinalibus testaceis (ante mortem distincte, post mortem plus minus indistincte); alis hyalinis. Clypeo transverso, apice in medio modice profunde emarginato, fronte ante mortem sat plana, post mortem plus minus contracta, hoc modo capite presertim verticem versus brevissimo, modice sparce setoso, oculis etiam modice setosis, mesonoto sparce setoso, tegulis in medio unisetosis, venis subcostali 1-setosa, marginali 10-setosa. Antennis articulis funiculi 2-8 longitudinaliter costatis, et modice pilosis. Long. corp.: 1 mm., l. Lat. thor.: 0 mm., 38.*

♂ *Testaceus, funiculo clavam versus fuso. Long. corp.: 1-1,3 mm.*

*Caput sparce setosum, antice modice prominens, clypeo brevi, in medio bilobo, a lobis usque ad angulos laterales truncato, oculis post mortem inconspicuis (forsam in vivo notatis), ocellis (post mortem) inconspicuis, articulis clavae costatis. Alae thorace aquelongae.*

### **PSILOGASTEROIDES** Bréthes, n. gen.

*A Psilogasteri Bl. vicinus sed thorace haud sphaeroidalis, sed sat elongato. Antennae 14-articulatae, scapo plus minus dimidio flagelli aequante, articulo 3<sup>o</sup> plus minus duplo longiore quam 2<sup>um</sup> vel*

*ANAL. MUS. NAC. Bs. As., SER. 3<sup>a</sup>, T. XIII. JUNIO 22, 1910.*

14

*spud*

*Spud. L. 1910*

*accordy & shorten*

4<sup>um</sup>, articulis 5-10 gradatim brevioribus, 11 conico quam precedentem paulum longiore. Alae stigmate ad tertium basalem attinente, hamatiformi. Scutelli simplici. Abdomen petiolatum, segmento 1º plus minus dimidium eceri abdominis aequante, segmento 2º cylindrico quam thoracem aequelongo, basin apicemque versus gradatim constricto, segmentis ceteris minutis.

Typus:

***Psilogasteroides formicarius* Brèthes, n. sp.**

*reddish* *very where & part* *gold rusty hairs*  
 ♀ *Ferrugineus, sparse ubique sat longe fulvo-pilosus, anten-*  
*nis et tarsis apicem versus pallidioribus, alis paulum fuliginosis.*  
*Long. corp.: 5 mm. Alae: 5 mm. Antennae: 3 mm.*

Fronte ante antennas bicornuta etiamque prope oculos pone  
 antenas; ocellis in triangulo aequalato dispositis. Pronoto anti-  
 cem verius parctato, antice vix bitumido, mesonoto lineis parapsi-  
 dalibus dimidio postice carinatis, axillis in medio haud contignis,  
 postice a scutello modice profunde separatis; separatione striata;  
 scutello paulum elevato, obliquo, sat plano, postscutello brevi,  
 segmento mediario quam scutellum aequelongo, tegulis lanceolatis,  
 mesopleuris linea vix horizontali notatis. Femoribus posticis  
 usque ad apicem abdominis attingentibus. Corpus totum micro-  
 scopice rugulosum dein tantum nitidum, *barely shiny*.

1 ♀ Catamarca (Spegazzini): XII, 1909.—Col. Mus. Nac. Buenos Aires.

## Fam. PROCTOTRUPIDAE.

***Inostemma mendozanum* Brèthes, n. sp.**

♀ *Nigrum, nitidum, trochanteribus totis, femoribus tibiisque*  
*basi et tarsis (apice obscuris) testaceis. Long. corp.: 1,2 mm.*

*Caput* transversum, minute reticulatum, fronte paululum, vertice magis forte impressis, ocellis posticis inter oculos quam ab ocellum antieum paulum magis approximatim, antennis seapo cylindrico, longo, articulis 2-4 ellipticis, 5-6 minutis, obconicis, 7-10 clavam elongatam formantibus. Thorax supra minute reticulatus, lineis parapsidalibus conspicuis, lobo medio mesonoti longitror-