

an  
au  
des  
for  
ave  
pro  
fini  
prol  
segn  
la t  
pleu  
dome  
subcy  
peu  
tête  
5° se

BRÈTHES J  
1927

Vermont, Sud-Promission de  
Dactylus Entomologischer Institut:  
T. 2. 1927. 1. 1.

Ent. Mitt. (Berlin) 16: 319-335  
3 figs

QL ~~57~~ 1461 E735

rautes normales, non g..., les femurs antérieurs avec un angle mousse subapical en dessus. Ailes hyalines, la veine sous-costale atteignant à peu près le milieu de l'aile, la marginale et la postmarginale subégales, la stiguale ayant un développement comme du  $\frac{1}{3}$  de la marginale.

Un exemplaire de San José (Costa Rica) Heinr. Schmidt coll.

Subf. *Eurytominae*.

*Decatoma cecidosiphaga* Brèthes. — Cette espèce se trouve aussi à Porto Alegre, où le Dr. J. Wille l'a recueillie également parasite de *Cecidoses eremita* Curt., en 1924/5.

Subf. *Eucharinae*.

*Kapala furcata* (Fab.) Cam. — Un exemplaire de S. Paulo, Saude, 20. III. 1921 (R. Fischer coll.).

*Eucharomorpha* (?) *brasiliensis* (n. sp): ♀ Capite thoraceque viridis tantulum cupreo-vergentibus, abdomine viridi-cyaneo, scapo pedibusque a trochanteribus ferrugineo-testaceis, apice tarsorum fusco, alis hyalinis. Long: 4 mm.

Les antennes sont simples, les articles cylindriques, le pédicelle un peu moindre que la moitié du scape. La tête et le thorax sont ponctués-rugueux, y compris le segment médiaire et le pétiole de l'abdomen. L'abdomen est circulaire, comprimé, complètement lisse. Le pétiole de l'abdomen est court, pas plus long que les coxas postérieures. Le segment médiaire n'a pas de carène médiane, mais des impressions stigmatiques latérales.

Obs. — Les descriptions de *E. Worcesteri* Gir. et *paraguayensis*

Gir. m'induisent à placer le présent insecte dans le genre actuel, mais comme je n'ai pu consulter les *Trans. Roy. Soc. S. Austr.* (37) 1912, qui ne se trouvent pas à Buénos Aires et où Girault a donné la description du genre *Eucharomorpha*, je ne saurais affirmer positivement si l'espèce que je décris est bien de ce genre.

De S. Paulo, Brésil, 3. XI. 1922 (J. Melzer coll.)

#### Subf. *Chalcidinae*.

*Spilochalcis Fischeri* (n. sp.): ♂ Lutea, mandibulis apice, pronoto puncto mediali antice, mesonoto maculis 3, media majore, tegulis, scutello in medio ample, mesopleuris deorsum versus, abdomine segmentis 2 basi apiceque latere, 3 dimidio apicali, 4—7 totis supra, coxis posticis basi et canthis lateralibus, femoribus posticis supra subtusque (haud distincte limitate) nigris; funiculo fusco subtus dilutiore, femoribus 4 anticis plus minus et tibiis posticis basi apiceque fuscis. Alis hyalinis contra venam marginalem tantum distincte et apice fuscis. Long: 5 mm.

Les poils qui couvrent le corps sont gris clair et sur les parties noires, ils sont noirs. La face est lisse, le front ponctué-ridé. Le thorax est ridé transversalement, le dos de l'écusson densément ponctué, non ombiliqué, son bord postérieur subarrondi. Le segment médiaire lisse, aréolé, les pleures lisses ainsi que les coxas postérieures. Le pétiole de l'abdomen est subcylindrique, à peine un peu plus long que le segment suivant, lisse. Les fémurs postérieurs sont modérément grossis, sublisses au bord externe, lenticulaires, leur bord inférieur avec une dent subbasale interne et une autre un peu moindre inférieure: celle-ci suivie d'environ 16 petites dents. Les ailes sont hyalines, les veines noires; une légère tache brune sous la marginale et l'extrémité des quatre ailes rembrunie.

De Rio de Janeiro, 7. VI. 1918 (R. Fischer coll.).

*Spilochalcis T-nigrum* (n. sp.): ♀ Flava, mandibulis apice, scapo apice, funiculo, puncto frontali, regione ocellorum, et capite postice, puncto pronoti antice, mesonoto lobo medio linea anteriore apicibus retrorsum versus tantum dilatatis atque linea media longitudinali in medio tantum dilatata, lobis lateralibus macula irregulariter trigona, axillis, scutello linea media apicem versus dilatata, segmento mediario basi, sutura pro-mesopleurali, coxis posticis macula supra vix basali, trochanteribus posticis, femoribus posticis apice dentibusque, tibiis posticis basi canthoque exteriore, abdomine segmentis 3—6 apice supra transverse et apice abdominis nigris; alis hyalinis, venis fuscis. Long: 6 mm.

Les poils du corps clairs, seuls ceux de l'écusson noirs. La tête est lisse: contre les yeux et derrière la tête la ponctuation est assez distincte. L'impression frontale derrière les antennes a une élévation