

CLAS. III. SYNISTATA. Panorpa.

251

Clypeus. 1289

Sutura omnino praecedentium, Antennae corporis longitudine clava oblonga, truncata. Caput fuscum fronde cinereo hirta. Thorax cinereus. Alae omnes albae macula marginali nigra. Abdomen nigrum deest.

109. PANORPA. *Os porrectum, cornicun.*
Maxilla bifida, truncata.
Antennae filiformes.

- 1. *P. alis aequalibus nigro maculatis.* communis
- 2. *P. alis aequalibus hyalinis apice fuscis.* germani.
- 3. *P. alis subulatis subincurvatis ciliatis, faemina aptera.* ca.
- 4. *P. alis immaculatis, abdome falcato, pedibus longissimis.* hyemalis.
- 5. *P. alis erectis: posticis sublinearibus longissimi.* tipularia.

alii anticis flavo fuscoque varii: posticis longissimi. halterata
alii maculis tribus aliis,
varietas praecedens.

110. RAPHIDIA. *Maxilla cornuta, integra.*
Labium breve, corneum.
Antennae filiformes.

- 1. *Alae cylindrica, alia macula marginali fusa.* notata.
- 2. *Alae cylindrica, alia impunctata.* Ophiopsis.

111. MOPS. *Palpi quatuor inaequales, subcapitati.*
Labium corneum, integrum.
Antennae moniliformes.

- 1. *Abdomine paleo piceo conico effundente,* adscissa.
Setosum Dens. Hybrida.
- 2. *Abdomine nigro, antennae moniliformes.* nigra.
- 3. *Abdomine nigro, thorax niger, oblique rotundatus, scutello* tecta.

252 CLAS. III. SYNISTATA. Tenethredo,

- tello acuminato. Abdomen petiolatum, aeneo nitidum, adscendens, comppresso conicum. Pedes pallidi femoribus basi nigris.
- Rosae.* 3. C. nigra abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis.
- Glechoma.* 3. C. fusca, thorace villoso.
- Quercus baccarum.* 4. C. nigra antennarum basi pedibusque flavescens.
- Quercus folini.* 5. C. nigra thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris.
- Quercus inferus.* 6. C. atra, antennis pedibusque pallidis.
- Quercus petioli.* 7. C. nigra pedibus albidis, femoribus fuscis.
- Quercus pedunculi.* 8. C. grisea, alis cruce linearis.
- Quercus romolis.* 9. C. pallida alis abdомineque nigris.
- Fagi.* 10. C. atra immaculata.
- viminalis.* 11. C. flava, thorace nigro.
- Capreae.* 12. C. viride nitida, pedibus pallidis.
- Salicis strobili.* 13. C. atra thoracia ergo virescente.
- Amerinas.* 14. C. nigra, pedibus pallidis.
- Pseuder.* 15. C. Ficus Capricorni.
- Sycomori.* 16. C. Ficus Sycomori.

112. TENTHREDO. Palpi quatuor filiformes.
Labium trifidum.
Antennae clavatae autem
liformes.

* Antennae clavatae.

femorata. 1. T. antennis clavatis luteis, corpore atro, femoribus maximis.