

contre ces insectes sur les murs, dans les lieux sales, quelquefois aussi sur les fleurs.

FIGITE SCUTELLAIRE; *figites scutellaris*.

Cynips scutellaris. Ross.

Long d'environ deux lignes; d'un noir très-luisant, avec les jambes et les tarsi d'un rouge brun; deux lignes imprimées et longitudinales sur le corselet; écusson avancé, gros, chagriné, avec deux gros points enfoncés; ailes blanches. — Commun en France.

CCCXLVI° GENRE.

EUCHARIS; *eucharis*. Leurs antennes sont droites et moniliformes comme dans les figites; mais l'abdomen est presque triangulaire ou conique, et pédonculé. — Sur les fleurs.

EUCHARIS RELEVÉ; *eucharis adscendens*.

Panz. Faun. ins. germ. fasc. 88, tab. 10.

Bronzée; pattes d'un jaune pâle. — En Allemagne. Je ne l'ai pas trouvée en France.


HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,
DES CRUSTACÉS
ET DES INSECTES.

OUVRAGE faisant suite aux Œuvres de LECLERC DE
BUFFON, et partie du Cours complet d'Histoire naturelle
rédigé par C. S. SONNINI, membre de plusieurs
Sociétés savantes.

PAR P. A. LATREILLE,

MEMBRE associé de l'Institut national de France, des Sociétés
Linnéenne de Londres, Philomathique, Histoire naturelle de Paris,
et de celle des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux,

TOME TREIZIÈME.



A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE F. DUFART,
AN XIII.