

P. A. LATREILLE

SCIENCIARUM ET ARTIUM INSTITUTI GALLICI , NEC NON
SOCIETATIS PHILOMATHICÆ , SCIENCIARUM , LITTERARUM
ARTIUMQUE BURDIGALENSIS , LINNEANÆ SODALIS , etc.

GENERA
CRUSTACEORUM

E T

INSECTORUM

SECUNDUM ORDINEM NATURALEM

IN FAMILIAS DISPOSITA , ICONIBUS EXEMPLISQUE

PLURIMIS EXPLICATA

« Quod alii venationibus , confabulationibus , tesseris , chartis ,
lusibus , compotationibus insumunt , illud ego insectis inda-
gandis , colendis , contemplandis impendo . »

LINNÆUS , *Fauna Suecica , prefatio.*

TOMUS TERTIUS

PARISIIS ET ARGENTORATI

APUD AMAND KŒNIG , BIBLIOPOLAM

1807

Insecta. Pterodiceræ.

vato; alis albis; femorum apice tibiarum tarsorumque maxima parte fusco-rufis.

Figites scutellaris. LATR. Hist. nat. des Crust. et des Insect., t. 13, p. 210; — Gener. Crust. et Insect., t. 1, tab. 12, fig. 4, fem.; fig. 5, mas.

Figites scutellaris. JUR. Hymenopt., p. 288.

Cynips scutellaris. ROSS. Faun. etrusc., mant. 2, app., p. 106. Frequens in Gallia, locis immundis.

ANNOTATIO. *Cynips ediogaster* Panzeri alis, antennarum articulorum numero ad figites revocanda; antennæ tamen non moniliformes; abdomen pediculo longiori instructum. Forte proprium genus.

II. *Antennæ, seminarum saltem, articulis duodecim aut undecim tantum; mandibulæ longiores quam latiores, arcuatæ, sensim in dentem acutissimum abeuntes, unciformes; palpi brevissimi aut inconspicui; abdomen longe pediculatum; alæ superæ areolis nullis.*

OBSERVATIONES. *Antennæ* crassæ, moniliformes, thorace paulo breviores, apicem versus sensim paulo tenuiores, articulis primo et tertio longioribus. *Palpi*, *maxilla labiumque* minima et oculos fugentia. *Thorax* gibbus, scutello producto, quandoque furcato. *Alæ* superæ nervo unico et costali, abbreviato, ob apicem incrassato. *Abdomen* subtrigonum aut breviter ovatum, compressum, pediculo abrupto, prælongo, cylindrico.

CCCCL. GENUS. *EUCHARIS. Eucharis.*

Eucharis, LATR., FAB., PANZ., SPIN. — Cynips, OLIV. — Ichneumon, ROSS. — Chalcis, JURINE.

I. *Scutellum inerme.*

Eucharis ascendens. LATR. Hist. nat. des Crust. et des Insect.,

Latreille 1807

Ord. V. F. V., *Diploleparice.* 21

tom. 13, p. 210; *FAB. System. Piez.*, p. 157; *PANZ. Faun. Insect. Germ.* fasc. 88, fig. 10.

OBSERVATIONES. *Antennæ articulis duodecim, tertio et quarto sequentibus longioribus. Mandibulæ inermes.*

II. *Scutellum furcatum sive bispinosum.*

Eucharis furcata, *FAB.* — *Ichneumon Cyniformis*, *Ross.*
Faun. etrusc. mant. 2, *tab. 6, fig. G.*

OBSERVATIONES. Hanc ultimam speciem ab amico Maximiliano Spinola accepi; antennæ undecim-articulatæ. Stoll, *cicad.*, *tab. 28*, *fig. 164*, Echaridem *furcatam* Fabricii depinxisse videtur.

Posterioris *Eucharis flabellata* an proprii generis?

Dominus Savigni, qui ex Ægypto, Arabia et Syria rerum naturalium copiam ditissinam attulit, eas modo illustratus, *Echaridis* speciem novam, scutello furcato mecum communicauit. Hujus insecti e mandibulis una intus bidentata; altera vero unidentata.

F A M I L I A . S E X T A .

C Y N I P S E R A . C I N I P S È R E S .

ANNOTATIO. Familia characteres essentiales in paucis mutandi. Oviductus capillaris, plerumque trisetosus, recta porrectus, ex abdominis partis inferæ rima longitudinali enascens. Palpi semper breves vel parum producti, articulis ad summum quatuor; terminali majore. Antennæ fractæ, clavatae vel sensim extrorsum crassiores; saepius thorace multo breviores, in feminis saltem articulis distinctis a quinque ad decem, raro undecim vel duodecim et tunc vix discernendis. Pedes postici saltatorii. Alæ superæ areolis nullis aut paucissimis et imperfectis. Corpus sapius colore métallico aut variegato.