

1934

13. - Verhoeff K. W. - Artropoden aus südostalpinen Höhlen. 2. Aufl. Mitt. u. Höhlen Karstforschung, Heft. 2 - 1929.
14. - Verhoeff K. W. - Artropoden aus südostalpinen Höhlen. 7. Aufl. - Mitt. u. Höhlen u. Karstforschung, Heft 4, 1933, p. 10 - 14.

L. MASI

NOTA SUI CALCIDIDI DELL'ISOLA DI RODI

Un certo numero di questi Imenotteri parassiti raccolti a Rodi dal Sig. Alessandro Mochi durante l'estate dell'anno scorso, mi sono stati inviati in esame dal Dott. A. Alfieri, segretario della Società Entomologica d'Egitto. Non avendo potuto terminare lo studio di tutte le specie della collezione, mi limito qui, in una nota preliminare, ad indicare alcune, le quali, sebbene comuni e largamente diffuse, non erano state menzionate finora per quell'isola, e due altre interessanti perchè raccolte già nell'isola di Cipro e descritte da me recentemente come nuove (Ann. Mus. Civ. St. Nat., Genova, LVII, 1934).

La *Stilbula vitripennis* mihi, trovata la prima volta a Cipro dal Sig. Mauromoustakis, è rappresentata nel materiale di Rodi da tre esemplari maschi, presi in luglio e settembre. L'*Arthrolysis albicus*, della quale avevo veduto una sola femmina di Cipro, è rappresentata pure da un esemplare femmina. Adotto qui il nome generico di *Arthrolysis* Förster, invece di quello di *Picroscytus* Thomson, ritenendo, dopo una recente pubblicazione del Dott. A. B. Gahan, e dopo uno scambio di lettere che ho avuto con lui, che vi siano buoni argomenti per dare la preferenza alla denominazione più antica.

Fra le specie di Rodi si trova un *Megastigmus* che credo sia il *pistaciae* Walker: è un esemplare giallo, col torace ornato di una fascia longitudinale rossastra, a margini sfumati, e con addome giallo bruno. Una questione da risolversi è quella della validità del *Megastigmus Ballestrerii*, del Rondani, che pure è stato ottenuto dai frutti del pistacchio, e del terebinto, poichè è probabile che si tratti di un sinonimo della specie del Walker; d'altronde sarebbe interessante conoscere anche quali siano le varietà di questi Torimidi. Trovo nella raccolta del Sig. Mochi la *Brachymeria minuta* (L.) rappresentata tanto dalla forma tipica come dalla var. *alborufa*. La *Leucospis darsigera* è tipica, gialla e nera. Un esemplare femmina di *Ormyrus punctiger* Westw. ha i tergiti 2-4. del gastro di colore rameo. Altre specie da annoverare per la fauna dell'isola sono la *Brachymeria intermedia* Nees, la *Smicra biguttata* Spinola, il *Diomorus Kollari* Förster e la *Scutellista cyanea* Motschoulski.

1934

Bollettino della Società
Entomologica Italiana. 56 (8)

20 Oct 1934.