

Insectes utiles et nuisibles

169-174

Motschulsky

Chalcidites 116-174

revisées

ETUDES ENTOMOLOGIQUES,

rédigées

par

Victor de Motschulsky,

Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, en retraite &c.

Huitième année.

Déposé: chez M.M. Eggers à St Petersbourg, Leopold Voss à Leipzig
et Guérin-Meneville à Paris.

HELSINGFORS.

Inprimerie de la Société de Littérature Finnoise.

1489 pp.

A. FRANCK

1859.

LIBRAIRIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
Ancienne et Moderne
rue de Richelieu,
face de la Bibliothèque

cune articulation. Obtenu également du *Pseudococcus* du cañier.

Du *Leucanium coffeae* M. Nietner a reçu trois espèces de *Pteromalides* qui m'ont servies à former deux genres nouveaux sous le nom de *Scutellista* et de *Cephaleta*: le premier extrêmement remarquables par le grand développement de son écusson, qui recouvre presque entièrement l'abdomen, comme chez les *Pentatomides* des Hémiptères; les antennes des femelles sont coudées et claviformes, chez les mâles linéaires et atténuées vers l'extrémité.

Scutellista cyanea Motsch., *pentamera*, *breviter-ovata*, *subconvexa*, *crebre rugoso-punctata*, *subopaca*, *breviter cinereopilifera*, *cyanea*, *oculis nigris*, *antennis tibisque plus minusve testaceis*, *tarsis subalbis*, *apice nigris*; *capite lato*, *valde transverso*, *inter antennis subcarinato*, *impunctato*, *supra carina triangulariter impresso*, *fronte versus marginem triocellata*, *antennis antice in medio frontis insertis*, *subdistantes*, *capite thoraceque longitudine paulo longioribus*, in ♀ *fractis*, *clavatis*, art. 1:0 *elongato*, *subcylindrico*, 2:0 *triplo brevior*, *infusato*, 3:0—7:0 *duplo brevioribus*, *sensim dilatatis*, 8:0 *magno*, *elongato-ovato*, 1:0 *duplo latiore et brevior*, in ♂ *linearibus*, *crassiusculis*, *articulo 1:0 elongato*, 2:0 *brevissimo*, 3:0—6:0 *aequalibus*, *subcylindricis*, 1:0 *duplo latioribus*, *sed dimidio brevioribus*, 7:0 *longiori*, *conico*; *oculis magnis*, *planiusculis*, *in angulis posticis positis*; *thorace transverso*, *capite paulo angustiore*, *postice subangustato*, *antice linea transversa*, *lateraliter utrinque obliquo-impresso*; *scutello convexo*, *magno*, *longissimo*, *thorace angustiore*, *arcuatim-triangulari*, *antice subconstricto*, *apice rotundato*; *abdomine thoracis fere latitudine*, *subquadrato*, *glaberrimo*, *nitidissimo*, *nigro-cyaneo*, *postice subdilatato*, *marginè 7-denticulato*, *apice aculeato*; *subtus medio longitudinaliter acute carinato*; *alīs abdominis apice superantibus*, *hyalinis*, *anticis punctulatis*, *nervo costalis pone basin ramuli stigmatalis paulo continuato*, *hic sub-*

elongatus, obliquus, apice punctiformi dilatatus; tibiis apice spina longissima armato. ♀ Long. corp. $\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l. — alar. expans. $1\frac{1}{2}$ l. mas quadruplo minor.

Ce singulier insecte rappelle les *Thoracantha* Latr. et surtout la *Galearia violacea* Brüllé, Suites à Buffon IV, p. 572, tab. 38, f. 6, si l'on ôte la partie antérieure du corselet et considère le segment du milieu de cette figure comme tête; l'écusson est presque aussi long, mais non fendu, les ailes plus allongées, l'abdomen horizontal, large, la taille trois fois plus petite, jambes droites &c.

Les deux autres espèces sorties du *Leucanium coffeae*, sont:

Cephaleta purpureiventris Motsch., *tetramera, breviscula, postice attenuata, subconvexa, nitida, nigra, fronte subcyanea, abdomine purpureo-violaceo, antennis fuscotestaceis, geniculis, tibiis apice tarsisque antice subulbidis; capite latissimo, valde transverso, postice excavato-truncato, impunctato, fronte inter oculos impresso, antice leviter carinato, antennis capite thoraceque conjunctis longioribus, crassiusculis, filiformibus, antice in medio insertis, subdistantes, art. 1:0 elongato, cylindrico, apice infuscato, 2:0 brevissimo, fusco, 3:0 fere longitudinem primo aequali, sed latiore, 4—6 sensim brevioribus, subcompressis, 7:0 longiori, elongato-triangulari; oculis magnis, planiusculis, ad angulos posticis positus; thorace capite angustiore, transverso, convexo, antice posticeque aequaliter angustato, linea transversa antica distincta, laterali minus impressa; scutello magno, convexo, triangulariter attenuato, apice rotundato, abdominis basi non superante; hoc horizontali, subtransverso-cordiformi, subconvexo, glabro, segmento primo valde transverso, nigro-subviolaceo, segmentis sequentibus coeruleis; metathorace subquadrato, angulis rectis; alis hyalinis, anticis vix punctulatis, nervo costali subsinuato, ad cellulas apice interrupto, pone basin ramuli stigmaticalis paulo continuato, hic brevis, apice dilatato; tibiis inermis. Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.*