

femoribus supra lined nigra notatis; mandibulis elongatis, similiter dentatis, dente valido interno basali, dentibusque tribus parvis ante apicem positis; alis vix coloratis apicibus nonnihil infuscatis.

Long. corp. lin. 7½. Exp. alar. 9.

Hab. in Novâ Hollandiâ.—In Mus. Westw.

Genus THORACANTHA, Latr.

THORACANTHA FLABELLATA. *Thor. nigro-cærulea, nitida; scutello abdomen longè superante, nitidissimo, acutissimo, ad apicem in spinas duas gracillimas desinente, longitudinaliter striato; thorace transversim striato; alis sub scutello omnino occultatis; antennis nigris 12-articulatis, articulis duobus basalibus fulvis, reliquis nigris et singulis (ultimo elongato excepto) ramum longum emittentibus; pedibus fulvis.*

Long. corp. (scutello incluso) lin. 2½.

Hab. in Brasiliâ.—In Mus. Dom. Swainson.

Genus CAMPYLONYX, Westw. (Fam. Proctotrupidæ.)

Caput latum, oculis valdè prominulis, fronte emarginato.

Antennæ ♀ graciles, elongatæ, apicem versus parum incrassatæ.

Thorax valdè elongatus, continuus, collare longius quam latum.

Metathorax longus, bicanaliculatus.

Pedes antici valdè elongati, raptorii, tarsorum unguiculis maximis recurvatis.

Alarum nervi ut in genere *Anteone*.

Abdomen ovale.

Obs. A genere *Gonatopo* differt thorace continuo et alato, ab *Anteone* thoracis et antennarum structurâ.

CAMPYLONYX AMPULICIFORMIS. *Camp. niger, punctatus; abdomine lævi nitido; antennis (nisi ad basin), pedibus (nisi femoribus et tiliarum apice), collaris lateribus, marginibusque segmentorum abdominalium testaceo-rufescentibus; capite anticè obscure flavescente; alis brevibus pallidè flavescentibus, fasciis duabus fuscis ornatis.*

Long. corp. lin. 4. Exp. alar. lin. 3.

Hab. "humi luco de Feuillent, 8 Julii, 1807," prope villam "Lyons" Galliæ.—In Mus. Com. De Jeanii.

Genus TRIGONALYS, Westw.

Caput magnum, planum, anticè latius.

Mandibulæ validæ, 3-dentatæ.

Palpi elongati.

Antennæ capitis cum thorace longitudine, graciles, filiformes, ad apicem attenuatæ, 24-articulatæ.

Thorax ovatus.

Abdomen convexum, anticè et posticè attenuatum, vix pedunculatum, apice incurvo.

Alæ cellulâ 1 marginali, 4 submarginalibus, quarum 1mâ majori.

Præp. 8

Proct.

abdo

Th

Lo

Ha

Com

Co

Ca

Ma

An

Th

Ab

Pe

Ob

Di

t

Lon

Ha

1. M

c

li

se

n

M

si

Lon

Ha

2. M

qu

fu

ne

Long

Ha

Hope.

3. M

394., a

libri · P

Genus DIRHINUS, Dalm.

DIRHINUS MAURITIANUS. *Dir. æneo-niger*; capite thoraceque crassè punctatis, illius cornubus brevioribus obtusis; antennis nigris articulo 1mo ad basin et apicem piceo; tibiaram quatuor anticarum apicibus tarsisque omnibus testaceis; scutello in medio læviusculo; metathorace longitudinaliter 4-costato et utrinque angulato; abdomine nigro nitido, subtùs (♀) fornicato.

Long. corp. lin. 2. Exp. alar. lin. 3.

Hab. in Insulâ Mauritiî, Dom. Templeton.

Genus METAPELMA, Westw. (Fam. Chalcididæ.)

Thorax ante alas elongatus, declivis.

Antennæ graciles, fere thoracis longitudine, apicem versus paullo crassiores, apice ipso obliquè truncato.

Abdomen compressum, oviductu exserto, abdominis longitudine.

Pedes intermediî longiores, femoribus paullo retrò-curvatis, tibiis calcari longo instructis, tarsis vix dilatatis subtùs ciliatis, articulo 1mo longiore: postici crassiores, tibiis tarsorumque basi valdè dilatatis compressis.

Obs. Genus *Eupelmo* affine.

METAPELMA SPECTABILIS. *Met. capite thoraceque viridibus cupreo nitentibus; antennis nigris; abdomine nigro, chalybeo purpureoque nitente; pedibus quatuor anticis ferrugineis viridi subnitentibus; tarsis intermediis fuscis ad basin albidis; pedibus duobus posticis fuscis, femoribus basi rufis, tibiis basi albis; oviductu nigro; alis pone medium nubeculâ vix infumatis.*

Long. corp. lin. 2½; oviductûs, lin. 1. Exp. alar. lin. 3¾.

Hab. in Georgiâ Americæ.—In Mus. Brit.

Genus SCHIZASPIDIA, Westw. (Fam. Chalcididæ.)

Corpus breve, crassum.

Antennæ breves, crassæ, 13-articulatæ, articulis 2do et 3tio fere æqualibus, 4to-10mum internè serratis, reliquis tribus in unum coalitis.

Scutellum magnum, posticè supra abdomen productum et ejus dimidium basale superans, ad apicem furcatum.

Abdomen thorace paullo majus, suprâ planum, pedunculo (fere tertiam partem abdominis longitudine æquante) ad thoracem affixum.

Obs. *Perilampum* (habitu) cum *Eucharide* (scutello armato) conjungens.

SCHIZASPIDIA FURCIFER. *Schiz. ænea; thoracis parte anticâ transversim striatâ; scutelli lateribus longitudinaliter sulcatis; abdo-*

minis dimidio basali cœruleo, apicali fulvo; antennis pedibusque fulvescentibus; alis maculâ substigmatali fuscescente.

Long. corp. lin. 2½. Exp. alar. lin. 4½.

Hab. apud Bengaliam.—In Mus. Brit.

Variat magnitudine minore; antennis profundius serratis; thorace magis sulcato; abdomine toto fulvo. (An sexus alter? ♂?)

Genus **PENTACLADIA**, *Westw.* (Fam. *Chalcididæ*.)

Eulopho affinis: differt antennis 9-articulatis, articulo 2do parvo, 3tio-7mum ramum longum emittentibus, 8vo 9noque majoribus oblongo-ovalibus; abdomine compresso.

PENTACLADIA ELEGANS. *Pent. splendide purpureo-cœrulescens, antennis obscurioribus.*

Eulopho ramicorni dimidio longior.

Hab. ?—In Mus. Com. Dejean (olim Latreillii).

Genus **CHALCITELLA**, *Westw.* (Fam. *Chalcididæ*.)

Antennæ ad os insertæ, 12?-13?-articulatæ, articulo 2do brevi, 3tio et sex sequentibus paullo majoribus, valdè continuis, reliquis tribus vel quatuor massam elongato-conicam efformantibus. *Metathorax* valdè declivis.

Pedunculus dimidium abdominis longitudine æquans, gracilis, cylindricus.

Femora intermedia ad basin gracilia, ad apicem subclavata; coxæ posticæ crassæ, longæ; femora postica maxima, subtùs 7-dentata.

Obs. Genus *Chalcidibus* typicalibus (ex. gr. *Sispes*) affine.

CHALCITELLA EVANIOIDES. *Chalc. nigra, punctata; abdomine compresso, nitido; antennarum basi, geniculis et interdum pedunculo piceis; tibiis tarsisque magis testaceis.*

Long. corp. lin. 1½. Exp. alar. lin. 2.

Hab. in Insulâ Mauritiî, *Dom. Templeton.*

Genus **MACROTELEIA**, *Westw.* (Fam. *Proctotrupidæ*.)

Corpus longissimum, lineare.

Caput rotundatum, thoracis latitudine.

Antennæ in utroque sexu thoracis longitudine, 12-articulatæ, ♂ articulis fere æqualibus, submoniliformibus, ♀ articulis sex terminalibus clavam crassam oblongam efformantibus.

Thorax ovatus: *scutello* inermi.

Alæ abdomine multo breviores, nervis ut in genere *Pteromalo* dispositis.

Abdomen fere sessile, longissimum, longitudinaliter striatum, seg-